




راهنمای آموزش مادران باردار در مورد تغذیه با شیرمادر

بازنگری و تدوین بترتیب حروف الفبا:
دکتر سید حامد برکاتی، دکتر محمود راوری، دکتر ناهید عزالدین زنجانی سوسن سعدوندیان، دکتر خلیل فریور
ناشر: اندیشه ماندگار
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۳۳۴-۷۹-۸
نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۷
تیراژ: ۵۰۰۰ نسخه

فهرست

| | |
|---------|---|
| ۵..... | پیشگفتار..... |
| ۷..... | مقدمه..... |
| ۹..... | فصل اول - اهمیت و مزایای تغذیه با شیرمادر..... |
| ۱۳..... | فصل دوم - برتری تغذیه با شیرمادر بر تغذیه مصنوعی..... |
| ۱۷..... | فصل سوم - چگونگی شروع تغذیه با شیرمادر و تداوم آن..... |
| ۲۳..... | فصل چهارم - وضعیت صحیح شیردهی..... |
| ۲۷..... | فصل پنجم - دوشیدن شیرمادر، نحوه نگهداری و مصرف شیردوشیده شده..... |



پیشگفتار

تغذیه با شیر مادر در سطح جهان می‌تواند جان شیرخواران را نجات داده و بار بیماری‌های کودکان و همچنین مادران را کاهش دهد و در ارتقا سلامت آنان نقش کلیدی دارد. ترویج تغذیه با شیر مادر از ارکان اساسی خدمات و مراقبت‌های بهداشتی مادر و شیرخوار محسوب می‌شود. ملاقات‌های مادر در دوران بارداری و قبل از زایمان زمان بسیار مناسبی جهت حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر است. آموزش‌های قبل از تولد در مورد روش‌ها و اداره شیردهی بویژه اگر با حمایت‌های پس از زایمان همراه باشد سبب تغییرات موثر و مثبت از جمله شروع موفق شیردهی پس از زایمان، انحصاری بودن آن و تداوم شیردهی خواهد شد.

تدوین راهنما برای کارکنان جهت آموزش مادران در دوره بارداری و کنترل کیفیت آموزش‌های ارائه شده به آنان ضرورتی برای موفقیت مادران در تغذیه انحصاری با شیرمادر در ۶ ماه اول و تداوم آن تا ۲ سالگی محسوب می‌شود. راهنمای حاضر حاوی مطالب آموزشی ویژه مادران در مقطع بارداری است که نسخه اولیه آن در سال ۱۳۸۸ با تلاش همکاران معاونت بهداشتی وقت دانشگاه علوم پزشکی مازندران از جمله خانم میترا هاشمی کارشناس برنامه کودکان، خانم مهوش امیر حکیمی کارشناس امور بهورزی با همکاری سایر کارشناسان بهداشت خانواده، مراکز بهداشت و مربیان آموزشگاه بهورزی و کارکنان بیمارستان‌های تابعه دانشگاه مازندران تهیه شد که توسط اداره سلامت کودکان با استفاده از رهنمودهای برخی از اعضای کمیته کشوری شیر مادر سرکار خانم‌ها دکتر ناهید عزالدین زنجانی، دکتر سوسن پارسای و دکتر بلقیس اولادی و توسط جناب آقای دکتر خلیل فریورو سرکار خانم سوسن سعدوندیان تکمیل، چاپ و توزیع شد که از آن موقع تاکنون با عنوان «راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی» مورد استفاده است. این راهنما اینک با توجه به مطالب علمی روز بازنگاری و در اختیار قرار می‌گیرد.

هدف این راهنما ارتقا آگاهی و آماده کردن مادران باردار برای شیردهی و همچنین ارتقا عملکرد کارکنان عهده دار مراقبت‌های بهداشتی مادران و کودکان و مراقبین سلامت برای فراهم نمودن حمایت‌های ضروری و ارائه توصیه‌های لازم و استاندارد به مادران در طول بارداری، و نیز ایجاد انگیزه و تحکیم اعتماد به نفس و رفع نگرانی‌های مادران برای شروع و تداوم تغذیه با شیرمادر است تا دسترسی شیرخواران را به شیرمادران شان ارتقا دهد. بعلاوه شناسایی مادران باردار نیازمند مراقبت ویژه برای شیردهی، به منظور ارائه حمایت‌های لازم در حین زایمان و پس از آن مد نظر است که موجب موفقیت بیشتر برای برقراری تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان و شروع تغذیه با شیرمادر در لحظات طلایی ساعت اول تولد می‌گردد که منجر به افزایش طول مدت شیردهی و ارتقاء سلامت مادر و کودک خواهد شد.

ضمناً از سرکار خانم فاطمه راهی مشاور شیردهی و کارشناس محترم پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی ساوه برای در اختیار قرار دادن عکس‌های وضعیت‌های مختلف شیردهی تشکر و قدردانی می‌گردد.

مقدمه

علیرغم آنکه شیردهی یک فرآیند فیزیولوژیکی است، اما نباید تصور کرد که هر مادری به عنوان یک عمل طبیعی می‌تواند بدون آمادگی یا حمایت از عهده آن برآید، چون این تصور در مورد همه زنان صدق نمی‌کند. شیردهی موفق نیاز به آموزش، حمایت و نگرش مثبت در محیط زندگی مادر دارد. به ویژه که معمولاً یک سری پیام‌ها در جامعه از اجرای چنین رفتارهای طبیعی جلوگیری می‌کنند. لذا کارکنان نظام سلامت باید امکانات آموزش، حمایت و تشویق مناسب برای شیردهی را فراهم آورند.

در برخی فرهنگ‌ها آموزش و حمایت توسط مادر بزرگ‌ها، نزدیکان و سایر اقوام رایج است اما در جوامع مدرن نقش پدر مهم‌تر شده است و برنامه‌های آموزشی باید شامل پدران و تشویق آنها به درک مزایای تغذیه با شیرمادر و ضرورت حمایت از مادر باشد. آموزش زن باردار درباره تولد کودک و تغذیه با شیرمادر، بخش ضروری مراقبت خوب دوران بارداری و اقدام سوم از ده اقدام بیمارستان‌های دوستدار کودک است. از طرفی می‌توان علاوه بر پدر، سایر اعضا خانواده را نیز که قادر به حمایت تغذیه با شیرمادر هستند، آموزش داد.

کارکنان نظام سلامت اعم از متخصصین زنان، متخصصین کودکان، ماماها، پرستاران، مشاورین شیردهی و نیز گروه‌های حمایتی مادر به مادر و سازمان‌های مردمی نقش مهمی در آموزش و حمایت مادر در مراحل و سطوح مختلف دارند و بویژه اهمیت توصیه پزشکان را هرگز نباید دست کم گرفت. فواید شیرمادر برای ارتقا سلامت، تلاش برای همکاری و هماهنگی حرفه‌ای در میان همه کارکنان نظام سلامت را می‌طلبد تا زنان و خانواده‌هایشان را برای انتخاب تغذیه با شیرمادر آموزش داده و تشویق کنند.

اولین ویزیت دوران بارداری بهترین زمان جهت تشویق یا تقویت تصمیم مادر برای شیردهی و همچنین زمان مناسبی است که اجازه دهیم مادر مزایای شیرمادر و برتری آن بر شیرمصنوعی و اقدامات اولیه برای شیردهی موفق را بداند. اگر مادر باردار هنوز تصمیم به تغذیه با شیرمادر نگرفته باشد این ملاقات و ملاقات‌های بعدی می‌تواند فرصتی برای تصمیم‌گیری ایجاد کند.

امروزه با کوتاه‌تر شدن زمان بستری در بیمارستان ضروری است که زنان باردار با دانش پایه مناسب که در طول بارداری بدست آورده‌اند برای زایمان در بیمارستان حاضر شوند و این به ویژه در موفقیت اقدامات بیمارستانی و افزایش مدت شیردهی موثر است و بدین ترتیب آموزش‌ها در بیمارستان می‌تواند بیشتر بر جوانب عملی شیردهی مثل چگونگی پستان گرفتن و روش‌های شیردهی متمرکز گردد.

سازمان جهانی بهداشت برای آموزش تغذیه با شیرمادر به مادران باردار، حداقل ۸ موضوع را تعیین کرده است. از جمله:

- فواید تغذیه با شیرمادر
- تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله پس از تولد و شروع شیرمادر ظرف ساعت اول
- اهمیت هم‌اتاقی مادر و نوزاد
- وضعیت صحیح شیردهی
- تغذیه برحسب تقاضای شیرخوار
- راه‌پی بردن به کفایت شیرمادر

• تغذیه انحصاری با شیرمادر در ۶ ماه اول

• خطرات تغذیه مصنوعی

در فصول مختلف این کتاب، مطالب لازم در مورد موضوعات فوق بعلاوه نکات مهم دیگری (مثل کمیت و کیفیت آغوز، نیاز نوزاد در روزهای اول و دوشیدن شیرو...) برای شما کارکنان بهداشتی درمانی جهت آموزش مادران در بارداری بحث شده است. چنانچه مادر نسبت به این موارد آگاهی قبلی داشته باشد، پس از زایمان با اعتماد بنفس بیشتری نسبت به کفایت شیرش برای تامین نیازهای نوزاد، می تواند به شیردهی ادامه دهد و با کمک کارکنان دوشیدن را عملاتجربه نماید.

در نظر است این کتاب راهنما طی ۴ جلسه به مادران در دوران بارداری آموزش داده شود، به گونه ای که آموزش ها براساس توصیه سازمان جهانی بهداشت تا هفته ۳۲ بارداری پایان پذیرد. با توجه به توالی مراقبت های دوران بارداری در برنامه مادران به شرح ذیل:

• مراقبت اول: هفته ۱۰-۶ بارداری

• مراقبت دوم: هفته ۲۰-۱۶ بارداری

• مراقبت سوم: هفته ۳۰-۲۶ بارداری

• مراقبت چهارم: هفته ۳۴-۳۱ بارداری

• مراقبت پنجم: هفته ۳۷-۳۵ بارداری

• مراقبت های ششم تا هشتم: هفته ۴۰-۳۸ بارداری،

آموزش های این مجموعه از مراقبت اول آغاز شود و در مراقبت چهارم پایان پذیرد. لازم است در مراقبت پنجم مروری بر آموزش های ارائه شده و اشاره به مطالب با توجه به نیازهای آموزشی مادر و کنترل آموخته های او انجام شود. با استفاده از روش ها و مهارت های برقراری ارتباط به مادر فرصت بیان نگرانی ها داده شود تا مادر سئوالات خود را مطرح نموده و اطلاعات لازم را کسب نماید. برای موثر واقع شدن آموزش ها با توجه به بافت فرهنگی مناطق مختلف و سطح سواد مادران از وسایل کمک آموزشی در دسترس و تصاویر مرتبط استفاده شود. ضروری است در هر مرحله از آموزش، چک لیست آموزش ها برای هر مادر تکمیل گردد و از حضور مادر در آموزش ها و کسب آگاهی های او اطمینان حاصل شود.

لازم به ذکر است که آموزش های شیردهی قبل از زایمان اگر به صورت کارگاهی اداره شود می تواند شروع شیردهی، تداوم آن و توانمندی مادر را به خوبی افزایش دهد. اگر در این آموزش ها از وسایل کمک آموزشی مانند عروسک مدل شیرخوار و پستان، فیلم های ویدئویی... استفاده شود موثرتر خواهد بود. آموزش گروهی قبل از زایمان، ملاقات های اختصاصی در مورد شیردهی، مشاوره با مادران موفق در شیردهی اقداماتی هستند که شانس شروع شیردهی از پستان، طول مدت و انحصاری بودن آن را افزایش می دهد.

شما کارکنان بهداشتی درمانی در حوزه بهداشت و درمان باید آگاه باشید که حمایت از تغذیه با شیرمادر که از دوران بارداری شروع می شود وقتی بیشترین اثر را دارد که همچون حلقه های یک زنجیره با اقدامات مناسب حین زایمان، آموزش های پس از تولد و هنگام ترخیص، مراقبت های دوره ای و مشاوره شیردهی و نیز مقابله با ترویج شیرمصنوعی همراه باشد. شما دست اندرکاران مراقبت های بهداشتی که از اثرات منفی تبلیغات کمپانی های شیرمصنوعی آگاه هستید، تلاش برای حفاظت مادران در برابر بازاریابی و تبلیغات شیرمصنوعی یکی از وظایف مهم شماست تا مادران بتوانند با اعتماد به نفس و اطمینان به توانایی خود شیوه طبیعی تغذیه شیرخوار را انتخاب و با موفقیت عمل کنند.

فصل اول - اهمیت و مزایای تغذیه با شیر مادر

اهداف آموزشی

- آگاهی از اهمیت تغذیه با شیر مادر در دین مبین اسلام
- شناخت مزایای تغذیه با شیر مادر برای مادر و خانواده
- شناخت مزایای تغذیه با شیر مادر برای کودک
- شناخت دیگر مزایای بی نظیر شیرمادر (تغییر ترکیبات شیر مادر در مراحل مختلف و در هر وعده شیردهی، عوامل ایمنی بخش شیر مادر، ترکیب خاص شیر مادر برای نوزاد نارس...)

اهمیت تغذیه با شیر مادر در دین مبین اسلام: شیر دادن عبادت است.

- مطالب مهمی در مورد تغذیه با شیرمادر و احکام آن، حدود ۱۴ قرن پیش در قرآن کریم و روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام و نیز کتب فقهی که مطابق با توصیه ها و علم روز می باشد، بیان شده است.
- شیر مادر بویژه آغوز حق نوزاد و اولین تغذیه حلال و طیب از مائده الهی برای شیرخواران است. در قرآن کریم در ۸ آیه مستقیماً بحث شیرمادر مطرح شده که مهمترین آنها آیه ۲۳۳ سوره بقره است. طبق این آیه: مادرانی که می خواهند به نحو کامل به فرزندان خود شیر دهند، لازم است ۲ سال تمام آنها را از پستان خود شیر دهند.
- اگر پدر و مادر با مشورت و رضایت یکدیگر خواستند کودک را زودتر از شیر بگیرند، گناهی برای آنها محسوب نمی شود و هرگاه خواستند برای شیر دادن دایه بگیرند در صورتی که خوراک و پوشاک او را در حد متعارف و نیکو تامین کنند مانعی نیست... حتی در صورت طلاق لازم است پدر خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته در مدت شیر دادن فراهم نماید.
- همچنین در این آیه برای والدات حق حضانت، حق دوجانبه شیر دادن (هم برای رعایت حال فرزند و هم مادر)، حق رعایت عواطف مادر، بهره مند شدن از فواید و آثار فیزیولوژیک شیر دادن ذکر شده است.
- حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: حد واجب شیر دادن ۲۱ ماه است و آنچه از آن کم شود به کودک ستم شده است و اگر اراده اتمام دوران شیردهی را دارد دو سال کامل مطلوب است... زن در دوران بارداری، زایمان، شیر دادن، اجر مجاهد در راه خدا را دارد و اگر در این زمان از دنیا برود برای او اجر شهید است.
- هرگاه برای مادر، حدی لازم شود اجرای حکم تا پایان دوره شیردهی به تأخیر می افتد.
- در دوران شیردهی روزه ماه رمضان، بدون پرداخت کفاره به تأخیر می افتد و مادر پس از پایان شیردهی روزه خواهد گرفت.
- حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: بیدار شدن مادر و شیر دادن او در شب، ثواب و اجری دارد و برای هر جرعه

شیری که می‌دهد، پاداش او معادل است با آنکه هفتاد بنده را در راه خدا آزاد کرده است... خداوند متعال روزی کودک را در دو پستان مادر قرار داده است. در بخشی آب و در بخش دیگر غذای او را و از هنگام ولادت کودک به تناسب نیاز هر روز وی، روزی متناسب آن روز او را مقرر فرموده است.

مزایای شیر دهی برای مادر و خانواده

تغذیه با شیر مادر بر سلامت حال و آینده مادر و کودک اثرات بسیار مهمی دارد. هم عمل شیردهی از پستان و هم تغذیه با شیر مادر حائز اهمیت است.

- مکیدن پستان بلافاصله بعد از تولد توسط نوزاد موجب جمع شدن رحم و در نتیجه کاهش خونریزی و کاهش کم خونی مادر می‌شود.
- مادرانی که شیر می‌دهند کمتر دچار سرطان پستان و تخمدان و دهانه رحم می‌شوند.
- مادرانی که شیر می‌دهند، به واسطه مصرف شدن تدریجی مقدار چربی که در دوران بارداری در بدن آنان ذخیره شده، زودتر به وزن قبل از بارداری خود برمی‌گردند و در نتیجه چاقی در آنان کمتر است. شیردهی اثر نامطلوب بر تغییر اندام مادر و اندازه پستان ندارد.
- مادرانی که شیر می‌دهند در هنگام کهولت به پوکی استخوان و شکستگی استخوان ران که در افراد مسن شایع است، گرفتار نمی‌شوند. بعلاوه با شیردهی احتمال بروز و عود آرتروز روماتوئید و MS کاهش می‌یابد.
- قند خون مادر بهتر کنترل می‌شود و به پیشگیری از دیابت نوع ۲ کمک می‌کند.
- مادرانی که شیر می‌دهند در خانه و هنگام مسافرت برای تغذیه شیرخوار راحت تر هستند و کمتر دچار استرس و اضطراب می‌شوند.
- تغذیه با شیر مادر منجر به ایجاد رابطه عاطفی مستحکم و دو طرفه بین مادر و فرزند می‌گردد و هر دو از نظر عاطفی ارضا می‌شوند و احتمال کودک آزاری و خشونت مادر خیلی کمتر می‌شود، این مادران طفل خود را به فرزند خواندگی نمی‌سپارند و سر راه نمی‌گذارند.
- در ۶ ماه اول بعد از زایمان اگر تغذیه با شیر مادر بطور انحصاری و مکرر در روز و شب صورت گیرد و عادت ماهیانه مادر هنوز شروع نشده باشد، و از دادن مایعات و سایر شیرها به شیرخوار پرهیز شود، حاملگی مادر به تعویق می‌افتد.
- مادرانی که شیر می‌دهند به دلیل ترشح هورمون اکسی توسین، از امنیت خاطر و شادابی بیشتری برخوردار بوده و کمتر افسرده می‌شوند.
- به لحاظ سالم بودن کودک و کمتر بیمار شدن او؛ صرف وقت و مراجعه مادر به مراکز درمانی کمتر است و هزینه‌ای که برای درمان بیماری و یا خرید تغذیه جایگزین لازم است، برای خانواده پس انداز می‌شود. بعلاوه مادر شاغل نیز کمتر از کار غیبت می‌کند.

مزایای تغذیه با شیر مادر برای کودک

- تغذیه با شیر مادر سبب رشد و تکامل مطلوب و بقاء کودک می‌شود.
- شیر روزهای اول (کلستروم، آغوز یا ماک) بسیار مغذی و حاوی بیشترین مواد ایمنی بخش و حفاظتی برای مقابله در برابر بیماری‌ها است که اولین ایمن سازی کودک محسوب می‌شود. آغوز ملین است و به دفع مدفوع سیاه و چسبنده ابتدایی (مکونیوم) کمک کرده و از زردی نوزاد پیشگیری می‌کند.
- تغذیه با شیر مادر رابطه عاطفی صمیمی بین مادر و فرزند فراهم می‌کند که منجر به ارتقا تکامل عاطفی روانی

کودک شده و در دوران بلوغ موجب امنیت روانی بیشتری می‌گردد.

- شروع شیرمادر در ساعت اول تولد، امکان برقراری تماس پوستی مادر و نوزاد را تسهیل می‌نماید و این در گرم نگه داشتن و بهبود رشد و تکامل بویژه برای نوزادان نارس و بیمار نقش حیاتی دارد.
- شیرمادر تمام نیازهای تغذیه‌ای شیرخواران را در ۶ ماه اول تأمین می‌کند و شیرخوار حتی به آب هم نیاز ندارد.
- هضم شیرمادر بسیار خوب و آسان است و شیرخواران بویژه نوزادان زود به زود گرسنه می‌شوند و هر ۲-۱/۵ ساعت یکبار و گاه بیشتر به تغذیه از پستان نیاز دارند.
- تغذیه با شیرمادر بروز سرطان‌های دوران کودکی، آسم، اگزما، آلرژی و بسیاری بیماری‌های دیگر را کاهش می‌دهد.
- شیرمادر از سوء تغذیه پیشگیری می‌کند و احتمال چاقی کودک و چاقی مراحل بعدی زندگی در آینده را کاهش می‌دهد.
- شیرمادر احتمال بروز دیابت نوجوانان، پرفشاری خون و چاقی که نشانگرهای بیماری‌های قلبی و عروقی در سنین بزرگسالی هستند را کاهش می‌دهد.
- مرگ ناگهانی در کودکانی که شیرمادر می‌خورند، بسیار کمتر است.
- تکامل بینایی و تکامل راه رفتن در کودکانی که از شیرمادر تغذیه می‌شوند، خیلی سریع‌تر است.
- ضریب هوشی در کودکانی که شیرمادر می‌خورند، بالاتر است.
- ترکیب شیرمادر همراه با رشد شیرخوار و نیازهای تغذیه‌ای و در هر وعده شیردهی تغییر می‌کند.
- تغذیه با شیرمادر منجر به کاهش بروز عفونت‌های تنفسی می‌گردد و از عفونت‌های کلیه و مجاری ادراری نیز پیشگیری می‌کند.
- مرگ و میر ناشی از عفونت‌های گوارشی و بیماری‌های اسهالی در بین شیرخوارانی که مستقیماً از پستان مادر تغذیه می‌کنند تا ۲۵ برابر کمتر از شیرخوارانی است که با شیر مصنوعی تغذیه می‌شوند. ضمن اینکه میزان ابتلاء به اسهال و بیماری‌های انگلی نیز در آنان کمتر است.
- کودکی که با شیرمادر تغذیه می‌شود، کمتر دچار ناهنجاری‌های فک، رویش نابجا و پوسیدگی دندان‌ها می‌شود.
- تغذیه با پستان مادر به دلیل عملکرد زبان و عضلات دهانی صورت، تکامل دهان را تقویت نموده و این امر بویژه برای شیرخوارانی که مشکل ضعف عضلانی دارند مفید است. سلامت دهان و دندان، کاهش عفونت گوش و تکلم سلیس تراز مزایای تغذیه از پستان مادر است.

دیگر مزایای بی نظیر شیرمادر: شیرمادر بی نظیر و مناسب‌ترین تغذیه برای شیرخواران است

تغییرات ترکیب شیرمادر در مراحل مختلف و در هر وعده شیردهی:

- ترکیب شیرمادر برحسب سن و نیاز شیرخوار و همچنین از شروع تا پایان هر وعده تغذیه با شیرمادر، مابین دفعات مختلف شیردهی و نیز در طول روز تغییر می‌کند.
- کلستریوم یا آغوز که از ماه هفتم بارداری در پستان‌ها تولید می‌شود و در ۲-۳ روز اول پس از زایمان ادامه می‌یابد، بسیار مغذی و حاوی مواد ایمنی بخش فراوان است و برای محافظت نوزاد در برابر بیماری‌ها حیاتی است. میزان آغوز کم است اما برای معده خیلی کوچک نوزاد کافی و مناسب می‌باشد. بعلاوه کلیه‌های نوزاد هنوز تکامل لازم را پیدا نکرده‌اند تا از عهده دفع زیاد برآیند.
- پس از آغوز، شیرانتقالی از ۷ تا ۱۰ روز پس از تولد و سپس شیررسیده ترشح می‌شود. تمام مواد مغذی مورد

نیاز شیرخوار و موادی که به هضم، رشد و تکامل و پیشگیری از عفونت‌ها کمک می‌کند، در شیر مادر موجود است و با تغذیه مکرر شیرخوار برحسب نیاز وی، تولید آن افزایش می‌یابد و به تنهایی تا پایان ۶ ماهگی نیازهای شیرخوار را تامین و امکان بهترین الگوی رشد کودک را فراهم می‌کند.

- شیر مادر در ابتدای هر وعده (شیر پیشین) آبکی و روشن تر بنظر می‌رسد اما به تدریج که شیر خوار به مکیدن ادامه می‌دهد، چربی شیر ترشح شده (شیر پسین) بیشتر از ۳ برابر شیر اول می‌شود که غنی از انرژی و سفید رنگ است و به سیر شدن شیرخوار و وزن‌گیری او کمک می‌کند.

عوامل ایمنی بخش شیر مادر بی نظیر است:

- ورود انواع عوامل بیماری‌زای موجود در محیط زندگی به دستگاه گوارش و تنفس مادر، سبب ساخت پادتن‌های اختصاصی بر علیه عوامل بیماری‌زا می‌شود. این مواد از طریق شیر مادر به شیرخوار می‌رسند بنابراین شیرخوار پیوسته از پادتن‌های حفاظتی برخوردار است و تجویز هر نوع شیر مصنوعی یا مایعات دیگر حتی به مقدار کم می‌تواند این مکانیسم حفاظتی را مختل کند.
- شیر مادر برای نوزادان نارس ترکیب خاصی مطابق نیازهای آنان دارد:
- شیر مادری که نوزادش قبل از ۳۷ هفته بارداری به دنیا می‌آید حاوی پروتئین و چربی بیشتر و میزان بالاتری مواد معدنی شامل آهن و عوامل ایمنی بخش بیشتری نسبت به شیر نوزاد رسیده است که برای تامین نیازهای نوزاد نارس مناسب‌تر است.
- نوزادان نارس حتی قبل از آنکه بتوانند مستقیم پستان مادر را در دهان بگیرند، می‌توانند با شیر مادر تغذیه شوند. در این موارد مادر می‌تواند برحسب شرایط نوزاد نارس، او را زیر پستان گذاشته و شیر را در دهان او بدوشد و یا شیر دوشیده شده را با قاشق، فنجان یا لوله معده به او بدهند.

شیر مادر دارای همه مواد مورد نیاز شیر خوار با نسبت‌های صحیح همراه با مواد ایمنی بخش می‌باشد و به عنوان غذایی بی نظیر برای تغذیه شیرخواران شناخته شده است. تنها و بهترین جایگزین شیر مادر، شیر دایه است.



فصل دوم - برتری تغذیه با شیر مادر بر تغذیه مصنوعی

اهداف آموزشی:

- شناخت اختلافات عمده ترکیب شیر مادر و شیر مصنوعی و برتری شیر مادر
- خطرات تغذیه مصنوعی
- خطرات تغذیه با بطری و استفاده از گول زنک

شناخت اختلافات عمده ترکیب شیرمادر و شیر مصنوعی و برتری شیرمادر

شیر مصنوعی معمولاً از شیر گاو تهیه می شود و اختلافات بسیار زیادی با شیر مادر دارد:

تفاوت شیر مادر با شیر گاو

- شیر مادر حاوی انواع سلول های زنده دفاعی و عوامل مهم حفاظتی و ضد میکروبی است که شیر گاو و در نتیجه شیر مصنوعی فاقد آن می باشد.
- میزان پروتئین و سدیم شیر مادر به حدی است که به کلیه های نوزاد که هنوز کامل نشده اند آسیب نمی رساند ولی شیر گاو پروتئین بیشتری دارد و دفع مقادیر اضافی برای کلیه های نارس نوزاد دشوار است. رشد شیرخوار انسان نسبت به شیرخوار سایر پستانداران کندتر است لذا به پروتئین کمتری نیاز دارد. بعلاوه ترکیب پروتئین شیر گاو نیز متناسب با نیاز شیرخوار انسان نیست، بطوری که پروتئین شیر گاو بیشتر از نوعی است که در معده شیرخوار بصورت غیر قابل هضم درمی آید اما پروتئین شیر انسان ضد عفونت و هضم آن آسان است.
- مقدار آب موجود در شیر مادر کافی است و شیرخواران در ۶ ماه اول حتی در آب و هوای گرم نیاز به آب اضافی ندارند. اما شیرخوارانی که با شیر گاو تغذیه می شوند به علت دریافت مقادیر زیادی از نمک ها نیاز به آب اضافی دارند و دفع نمک های اضافی برای کلیه های آنها مشکل است.
- ترکیب چربی شیر مادر برای رشد مغز، چشم و سلامت عروقی شیرخوار بی نظیر است و بهتر از سایر شیرها هضم و جذب می شود، در حالی که مقدار چربی غیر اشباع شیر گاو بالا است و بدن را با مشکل افزایش کلسترول در سال های بعد مواجه می کند.
- جذب املاح مثل کلسیم، آهن و روی شیر مادر بیشتر از شیر گاو است. حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد آهن شیر مادر جذب بدن شیرخوار می شود، در حالی که جذب آهن شیر گاو خیلی ناچیز است. بطور کلی مواد معدنی در شیر مادر برای تأمین نیاز شیرخوار کافی است.
- ویتامین های شیر گاو کمتر از شیر مادر است، جذب ویتامین های شیر مادر نیز بهتر است.

خطرات تغذیه مصنوعی

- شیرخوارانی که با شیر مصنوعی تغذیه می‌شوند در معرض خطر ابتلاء به بیماری‌های تنفسی و گوارشی (اسهال و استفراغ، دل‌دردهای قولنجی و جمع شدن گاز)، عفونت گوش، عفونت ادراری، مننژیت، اگزما، آسم و... قرار دارند.
- با مصرف شیر مصنوعی احتمال ابتلاء به چاقی، بیماری‌های قلبی و عروقی و بیماری قند در بزرگسالی بیشتر می‌شود.
- ترکیب شیر مصنوعی یکسان است و همانند شیر مادر در هر وعده و با رشد شیرخوار بر حسب نیازهای او تغییر نمی‌کند و الگوی رشد و تکامل مناسب کودک را فراهم نمی‌کند.
- کودکان از فواید عاطفی تغذیه با شیر مادر و امنیت روانی ناشی از آن در دوران بلوغ محروم می‌شوند و این امر بر تکامل روانی اجتماعی کودک در آینده تاثیر می‌گذارد.
- شیرخوار از فواید شیر مادر در ارتقاء بهره‌های هوشی نیز محروم می‌شود.
- شیر مصنوعی در هنگام تهیه به سهولت آلوده می‌شود و یا اگر سریع مصرف نشود فاسد می‌گردد و این احتمال ابتلاء به بیماری‌های گوارشی را افزایش می‌دهد.
- طرز تهیه نادرست یعنی رقیق یا غلیظ درست کردن شیر مصنوعی کودک را با دریافت ناکافی یا زیاد مواد مغذی (سوء تغذیه و چاقی) مواجه می‌کند.
- مادر از فواید شیردهی (وضع روحی روانی بهتر، دیر شروع شدن عادت ماهانه و تاخیر حاملگی مجدد، از دست دادن وزن اضافی، کاهش ابتلا به سرطان پستان و تخمدان و شکستگی لگن، کاهش پوکی استخوان، بیماری قند و MS...) محروم می‌گردد.
- هزینه خرید شیر مصنوعی چندین برابر هزینه مورد نیاز برای تغذیه مطلوب مادر است، بعلاوه هزینه بیشتر بیمار شدن کودک به خانواده تحمیل می‌شود.
- تولید و مصرف شیر مصنوعی سبب آلودگی محیط زیست می‌شود. شیر مصنوعی نیاز به بسته بندی و حمل و نقل دارد و مصرف آن نیاز به بطری و سرشیشه، آب سالم و سوخت دارد که علاوه بر تحمیل بار مالی به خانواده و مراجعات بیشتر درمانی، موجب آلودگی محیط زیست و صرف منابع طبیعی می‌گردد.

خطرات استفاده از گول‌زنک و بطری

- نحوه مکیدن گول‌زنک و بطری با مکیدن پستان مادر متفاوت است. بویژه در ماه‌های اول سبب سردرگمی شیرخوار در مکیدن و امتناع او از گرفتن پستان و در نتیجه کاهش تحریک پستان و کاهش تولید شیر و در نهایت قطع شیر مادر می‌شود.
- استفاده از گول‌زنک خطر عفونت گوش میانی، عفونت قارچی دهان و برفک و پوسیدگی دندان را افزایش می‌دهد.
- استفاده از گول‌زنک با حرکات غیرطبیعی و تداخل در رشد طبیعی فک و دهان موجب رشد نامناسب دندان‌ها و در نتیجه سبب جفت نشدن دندان‌ها می‌شود.
- گول‌زنک بر تمایل کودک برای تقلید صداها و هوشمندی او اثر سوء دارد و باعث وابستگی مدام می‌شود و تکامل اجتماعی را با اشکال مواجه می‌کند.

سایر مشکلات عبارتند از:

- خس خس سینه، سرفه و اختلال در تنفس
- اسهال و استفراغ
- تب و کولیک (دل درد قولنجی)
- وزن گیری ناکافی
- احتمال جدا شدن لاستیک گول زنک و خفگی و پیدایش آلرژی به لاستیک آن
- اختلال خواب بدلیل بیرون افتادن گول زنک از دهان
- افزایش احتمال حاملگی زودرس به دلیل کمتر شدن میل شیرخوار به مکیدن پستان

در صورت محرومیت شیرخوار از شیر مادر به هر علت از جمله در بحران ها و مواقع اضطراری

بهترین جایگزین برای تغذیه کودک، شیر مادر دیگر (شیر دایه) است.

فصل سوم - چگونگی شروع تغذیه با شیر مادر و تداوم آن

اهداف آموزشی:

- شناخت مزایای برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان
- شناخت مزایای شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد
- شناخت مزایای هم اتاقی مادر و نوزاد
- شناخت روش صحیح تغذیه با شیر مادر (دفعات و مدت شیرخوردن در هر وعده، تغذیه انحصاری با شیر مادر، تداوم شیردهی...)
- شناخت نشانه‌های گرسنگی و سیری شیرخوار
- شناخت علائم کفایت شیر مادر

مزایای تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله پس از تولد

- تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله پس از تولد، نوزاد را گرم نگاه داشته و از کاهش دمای بدن نوزاد بویژه نوزاد نارس و کم وزن جلوگیری می‌کند.
- سبب آرامش مادر و نوزاد می‌شود.
- پیوند عاطفی مادر و کودک را تسریع و تسهیل می‌کند.
- تعداد تنفس و ضربان قلب نوزاد را منظم می‌کند و باعث ثبات قند خون می‌شود.
- نوزاد با میکروب‌های بدن مادر که برای او بیماری‌زا نیست، آشنا شده و در نتیجه دفاع بدنش بهتر می‌شود.
- گریه نوزاد و استرس و صرف انرژی او کاهش می‌یابد.
- به نوزاد اجازه می‌دهد پستان را پیدا کند و اولین تغذیه از پستان را شروع کند. به شروع موفق تغذیه انحصاری با شیر مادر کمک می‌کند.
- از مرگ و میر نوزادان پیشگیری می‌کند.

مزایای شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد:

بهترین زمان شروع تغذیه با شیر مادر، طی ساعت اول تولد است زیرا نوزادان در این هنگام بسیار هشیار و فعال هستند. پس از زایمان طبیعی و یا سزارین با بی‌حسی موضعی اغلب تغذیه با شیر مادر را می‌توان بلافاصله شروع کرد. پس از سزارین با بیهوشی عمومی، تغذیه با شیر مادر به محض هشیاری مادر انجام می‌شود.

- نوزاد سالم نیاز به هیچ نوع غذا یا آشامیدنی ندارد و باید اولین تغذیه او با شیر مادر (آغوز) شروع شود.
- با شروع شیردهی در ساعت اول تولد نوزاد آغوز را دریافت می‌کند که بسیار مغذی و ایمنی بخش است و به تولید

شیر کافی برای تغذیه بعدی کمک می‌کند. تغذیه مکرر با آغوز یا کلاستروم در روزهای اول تمام نیازهای تغذیه‌ای نوزادان را برطرف می‌کند.

- نوزادانی که پس از تولد خیلی زود تغذیه می‌شوند مکیدن در وضعیت صحیح را راحت‌تر آموخته و مدت طولانی‌تری با شیر مادر تغذیه می‌شوند و احتمال بروز مشکلاتی که منجر به توقف تغذیه آنها با شیر مادر در هفته‌های اول زندگی شود، بسیار کمتر است.
- باعث کاهش قابل توجه مرگ و میر نوزادان می‌شود. برای نوزاد کم وزن مفیدتر است چون احتمال مرگ و میر آنها بیشتر است و هنگام تولد به حمایت بیشتری نیاز دارند.
- نوزادانی که بعد از تولد، موادی غیر از شیر مادر دریافت می‌کنند، ممکن است پستان مادر را نگیرند و احتمال مواجه شدن با مشکلات تغذیه‌ای و توقف تغذیه آنها با شیر مادر بیشتر است. حتی یک یا دوبار تغذیه نوزاد با آب قند می‌تواند در تغذیه با شیر مادر و سلامت نوزاد تداخل ایجاد کند.
- با انقباض رحم، خروج جفت و کاهش خونریزی مادر همراه است.

هم‌اتاقی مادر و نوزاد

هم‌اتاقی مادر و نوزاد مزایای بسیاری دارد که باید مادر بداند. در بیمارستان مادر و نوزاد در یک اتاق و در کنار یکدیگر نگهداری می‌شوند، مادر در خانه نیز باید فرزندش را در کنار خود نگهدارد زیرا:

- شیرخوار بهتری خواهد و کمتر گریه می‌کند.
- تغذیه با شیر مادر به خوبی برقرار می‌شود و به مدت طولانی‌تری ادامه می‌یابد و وزن‌گیری شیرخوار سریع‌تر است.
- شیردهی در پاسخ به رفتارهای شیرخوار سریع‌تر انجام می‌شود و این موجب افزایش تولید شیر مادر می‌شود.
- مادر در مراقبت از فرزندش اعتماد به نفس پیدا می‌کند.
- مادر می‌تواند ببیند که فرزندش خوب و سالم است (در صورت جدایی نوزاد صدای گریه او از اتاق نوزادان موجب نگرانی مادر می‌شود).
- چنانچه نوزاد نزد مادر باشد نسبت به اینکه در اتاق نوزادان نگهداری شود، کمتر در معرض خطر عفونت‌ها قرار می‌گیرد.
- سبب ارتقا پیوند عاطفی مادر و نوزاد می‌شود.

روش صحیح تغذیه با شیر مادر

بهداشت پستان‌ها

- قبل از تغذیه شیرخوار و یا دوشیدن شیر شستشوی دست‌های مادر با آب و صابون لازم است اما شستشوی پستان لازم نیست و استحمام روزانه مادر کافی است. طی استحمام نیز نباید نوک پستان و هاله با صابون شسته شود چون سبب خشکی و زخم شدن آن می‌شود.

زمان شروع تغذیه با شیر مادر

- پس از تولد باید نوزاد بلافاصله روی قفسه سینه مادر در تماس پوست با پوست با او قرار گیرد و مادر ظرف یکساعت اول زایمان با مشاهده علائم آمادگی نوزاد، اولین شیردهی را شروع کند. همانطور که گفته شد شیر روزهای اول یا آغوز برای تغذیه نوزاد و پیشگیری از ابتلا او به انواع بیماری‌ها حیاتی است.

تعداد دفعات تغذیه با شیر مادر و مدت تغذیه در هر وعده

- تغذیه با شیر مادر باید بطور مکرر و برحسب تقاضای شیرخوار انجام شود، در نوزادان و تا سن ۸-۶ هفتگی که زمان استقرار شیردهی است دفعات تغذیه با شیر مادر ۱۲-۱۰ بار یا بیشتر در شبانه روز معمول است و نباید کمتر از ۸ بار باشد.
- مدت تغذیه شیرخوار در هر وعده نباید محدود شود زیرا شیر کافی دریافت نخواهد کرد و تولید شیر مادر نیز کاهش می یابد، پس باید اجازه داد به شیرخوردن ادامه دهد و خود پستان را رها کند. معمولاً نوزادان رسیده ۱۵-۱۰ دقیقه یا بیشتر بشرط آنکه پستان را به خوبی گرفته باشند، از هر پستان می کنند. اما برخی شیرخواران همزمان با کسب مهارت زودتر تمام می کنند.
- مهمترین عامل در افزایش شیرمادر، مکیدن مکرر، صحیح و موثر و تخلیه مرتب پستان ها بر حسب میل و تقاضای شیرخوار در شب و روز می باشد که از بروز مشکلات پستانی مانند احتقان و زخم نوک پستان جلوگیری می کند. اگر مادری دو قلو داشته باشد و هر دو قل را همزمان برای مکیدن به پستان بگذارد، پستان ها شیر بیشتری تولید می کنند. در صورت جدایی مادری و شیرخوار به هر علت و عدم امکان تغذیه مستقیم از پستان، شیر باید دوشیده شده و به کمک فنجان و یا قاشق به شیرخوار داده شود تا هم شیرمادر محروم نگردد و هم تولید شیر ادامه یابد.
- در صورت بروز مشکلات پستانی مانند احتقان، درد، زخم و شقاق نوک پستان که معمولاً علت آن پستان گرفتن نادرست و یا کشیدن پستان از دهان شیرخوار است، توصیه می شود مادر ضمن ادامه شیردهی برای گرفتن کمک و آموزش عملی به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نماید.

نکته مهم: پیشگیری از احتقان و مشکلات بعدی

شروع شیردهی بلافاصله پس از زایمان و شیردهی مکرر بر حسب تقاضای شیرخوار در وضعیت صحیح، به جریان یافتن سریع تر شیرمادر و برقراری آن و همچنین پیشگیری از بروز احتقان پستان و مشکلات بعدی کمک می کند.

تفاوت پستان پرومحتقن: پستان محتقن با پستان پرمفتاوت است، در روزهای اول پس از زایمان که شیرمادر رو به افزایش است، بعد از ۳-۴ روز هر دو پستان ممکن است گرم و سنگین شوند وقتی شیرخوار با مکیدن های مکرر به تخلیه شیر از پستان کمک کند، بعد از چند بار تغذیه، حالت سنگینی و احساس سفتی و پری پستان بهتر می شود. اما پستان های محتقن فوق العاده دردناک اند، پوست آنها کشیده و براق و ممکن است قرمز رنگ باشد. شیر خوب جریان ندارد و شیرخوار هنگام شیر خوردن دچار مشکل می شود و ممکن است مادر تب داشته باشد. بهترین درمان احتقان پستان نیز تخلیه شیر از پستان با مکیدن شیرخوار یا بوسیله دوشیدن شیر است. برای اینکه شیرخوار بتواند پستان را بگیرد باید هاله پستان را با کمی دوشیدن یا فشردن به عقب نرم کرد.

تغذیه از هر دو پستان

- شیرخوار باید در هفته های اول زندگی تا زمان برقراری کامل شیر مادر و اطمینان از مناسب بودن منحنی رشد، در هر وعده از هر دو پستان و بر حسب میل و تقاضایش تغذیه شود. باید به طفل اجازه داد تا شیر چرب انتهایی که باعث وزن گیری بهتر او می شود را دریافت نماید و خودش پستان را رها کند، سپس مادر پستان دیگر را به او عرضه کند تا اگر تمایل به مکیدن داشت از پستان دوم نیز تغذیه شود.
- در وعده بعد، شیردادن باید از پستانی شروع شود که شیرخوار در وعده قبل کمتر از آن شیر خورده یا اصلاً نخورده است.

تغذیه انحصاری با شیر مادر

- تغذیه انحصاری با شیر مادر یعنی شیرخوار از تولد تا پایان ۶ ماهگی فقط با شیر مادر تغذیه شود. شیر مادر به تنهایی برای تامین نیازهای او کافی است و به هیچ وجه نباید آب، آب قند، شیر مصنوعی و یا جوشانده ها و سایر مایعات دیگر و مواد گیاهی سنتی را به شیرخوار داد. فقط دادن قطره ویتامین (AD) از ۵-۳ روزگی توصیه می شود.
- از بطری و پستانک (گول زنک) نباید استفاده شود. زیرا سبب کاهش میل مکیدن پستان و کم شدن شیر مادر، انتقال آلودگی، عفونت و بیماری، تغییر فرم دندان ها و قالب فک شیرخوار می گردد.
- در تغذیه انحصاری با شیر مادر دفعات تغذیه و مدت مکیدن در هر وعده نباید محدود شود. تغذیه بطور مکرر در روز و شب مطابق نیاز شیرخوار انجام شود. اگر شیرخوار بیدار نشود باید بعد از ۳ ساعت او را بیدار کرده و شیر بدهند تا با تغذیه مکرر وی جریان شیر برقرار شود.

تغذیه با شیر مادر در روزهای اول تولد

- مادر باردار باید از مقدار آغوز و حجم معده نوزاد در روزهای اول تولد و ضرورت تغذیه مکرر وی آگاه باشد، در این صورت آمادگی لازم را پس از تولد نوزاد برای شیردهی مکرر دارد و با تصور ناکافی بودن شیرش، شیر کمکی را خودسرانه در روزهای اول شروع نخواهد کرد.
- یکی دو روز اول پس از زایمان پستان ها مقدار کمی کلاستروم یا آغوز به اندازه حجم معده و نیاز نوزاد تولید می کنند. اما بعد از چند روز (۴۰-۳۰ ساعت) ترشح شیر بیشتر می شود. اگر به نوزاد اجازه داده شود بلافاصله بعد از تولد پستان مادر را بمکد، افزایش شیر مادر سریع تر رخ می دهد.
- میزان آغوز برای معده خیلی کوچک نوزاد که در روز اول تولد به اندازه یک تیله بزرگ و در روز سوم به اندازه یک توپ پینگ پونگ است، کافی و مناسب می باشد.
- تغذیه مکرر نوزاد با شیر مادر، با توجه به حجم معده او که در روز دهم به اندازه یک تخم مرغ بزرگ و در روز سی ام (به اندازه ۱۲۰-۶۰ سی سی) می شود، نیازهای تغذیه ای وی را تامین می نماید.
- ویزیت ۳-۵ روزگی نوزاد برای ارزیابی وضعیت سلامت و کفایت تغذیه نوزاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این ویزیت تاکید می شود مادر شخصا نوزادش را همراهی کند. چون نحوه شیردهی مادر مشاهده و ارزیابی می شود و در صورت لزوم، برای رفع مشکل احتمالی و تدام موفق شیردهی راهنمایی می شود.



روز اول

به اندازه تیله بزرگ ۷-۵ سی سی
تولید شیر مادر حداقل ۷ سی سی در هر نوبت
متوسط دریافت شیر در هر نوبت تغذیه ۱۰-۲ سی سی



روز سوم

به اندازه توپ پینگ پنگ ۲۷-۲۲ سی سی
تولید شیر مادر حداقل ۳۸ سی سی در هر نوبت
متوسط دریافت شیر در هر نوبت تغذیه ۳۰-۱۵ سی سی



روز دهم

به اندازه تخم مرغ بزرگ ۸۱-۶۰ سی سی
تولید شیر مادر از روز پنجم حداقل ۷۰ سی سی در هر نوبت

روز سی ام

۱۲۰-۶۰ سی سی
تولید شیر مادر از ۱۰۵۰-۷۵۰ سی سی روزانه

تداوم تغذیه با شیر مادر

- از پایان ۶ ماهگی به بعد باید تغذیه با شیر مادر همراه با شروع غذاهای کمکی ادامه یابد. در سال دوم عمر نیز شیرمادر نقش اساسی در تامین نیازهای شیرخوار همراه با غذاهای خانواده دارد.
- شیرمادر تا پایان ۲ سالگی باید ادامه یابد و سپس در صورت تمایل شیرخوار می‌توان او را به تدریج از شیر گرفت.

نشانه‌های گرسنگی و سیری شیرخوار

- مادر باید به نشانه‌های گرسنگی و تمایل شیرخوار برای تغذیه از جمله: حرکت کره چشم، بهم زدن پلک‌ها، نگاه کردن به اطراف، حرکات دهان و اندام‌ها، مکیدن انگشتان و بردن هر چیزی به دهان توجه نماید و صبر نکند تا شیرخوار بخاطر گرسنگی گریه کند. چون گریه و جیغ و کمانه زدن علامت دیررس گرسنگی و زجر شیرخوار است.
- شیرخوار هنگامی که سیر شود دفعات مکیدن او کم و با فاصله بیشتر و غیر تغذیه‌ای شده، صدای بلع او کم و متوقف می‌شود، علائم گرسنگی برطرف می‌شود و با احساس راحتی و رضایت، به خواب می‌رود و خودش پستان را رها می‌کند و نیازی به خارج کردن پستان از دهان او نیست.

علائم کفایت شیر مادر

کفایت تغذیه شیرخوار با شیرمادر را به وسیله مقدار افزایش مورد انتظار وزن شیرخوار، تعداد دفعات ادرار و مدفوع، و وضعیت عمومی او می‌سنجند.

وزن گرفتن شیرخوار

بهترین راه تشخیص کفایت شیرمادر وزن کردن دوره‌ای شیرخوار و رسم منحنی رشد او روی کارت رشد است. معمولاً نوزادان در روزهای اول تولد کمی وزن از دست می‌دهند که نباید بیشتر از ۷ تا ۱۰ درصد وزن تولدشان باشد. این کاهش وزن در صورتی مجاز است که حال عمومی نوزاد خوب باشد و مشکلی از جمله علائم کم‌آبی نداشته باشد، پستان مادر به شیرآمده و پرو خالی شود و مکیدن‌های نوزاد با بلع همراه باشد و دفعات به پستان گذاشتن نوزاد کمتر از ۸ بار در شبانه‌روز نباشد. همزمان با افزایش شیرمادر در روزهای ۴ و ۵ نوزادان شروع به وزن‌گیری می‌کنند و طی یک تا دو هفته‌گی به وزن هنگام تولد خود و یا بیشتر می‌رسند. پس از آن طی ۶ ماه اول زندگی، افزایش وزنی حدود ۲۰۰-۱۰۰ گرم در هفته (و یا ۶۰۰ گرم در ماه) در صورت تغذیه انحصاری با شیرمادر مطلوب و نشان‌دهنده تغذیه کافی است.

دفع ادرار

در طول ۲ روز اول عمر تعداد ۱ یا ۲ کهنه خیس در روز برای نوزادانی که بطور انحصاری با شیرمادر تغذیه می‌شوند طبیعی است. از روز چهارم تولد تعداد ۶ کهنه مرطوب یا بیشتر در ۲۴ ساعت با ادرار کمرنگ نشانه دریافت کافی شیر مادر در شیرخوارانی است که بطور انحصاری با شیرمادر تغذیه می‌شوند.

اجابت مزاج


از طریق تعداد دفعات مدفوع و خصوصیات آن نیز می‌توان به میزان دریافت شیرمادر پی برد. اولین مدفوع نوزاد سبز سیاه تیره و قیری شکل است در روز اول و دوم یک بار دفع دارد و تا روز ۴ یا ۵ پس از تولد به مدفوع بینابینی سبز و سپس نرم و دانه دانه و زرد تبدیل می‌شود. از روز چهارم تولد تا یک ماهگی ۸-۳ بار اجابت مزاج در ۲۴ ساعت

طبیعی است. (بعد از یک ماهگی ممکن است این دفعات کاهش یابد و حتی هرچند روز یک بار یک اجابت مزاج داشته باشد.)

وضع عمومی

در صورت تغذیه کافی با شیر مادر، شیرخوار هشیار است، قدرت عضلانی مناسب و پوست شاداب دارد.

مادران آگاه باشند که مراجعات بموقع برای مراقبت های دوره ای کودک که مراقبین سلامت در هر بار مراجعه زمان آن را یادآوری می کنند، برای حفظ سلامت کودکان، پیشگیری از مشکلات احتمالی و مداخلات بموقع برای ارتقا سلامتی و تغذیه کودک حیاتی است. در مراجعات کارت رشد کودک را همراه داشته باشند.



فصل چهارم - وضعیت صحیح شیردهی

اهداف آموزشی

- شناخت وضعیت صحیح بغل کردن شیرخوار برای شیردهی
- شناخت وضعیت های مختلف شیردهی
- شناخت نحوه عرضه پستان به شیرخوار
- شناخت نحوه صحیح پستان گرفتن شیرخوار
- شناخت علائم مکیدن موثر پستان

وضعیت صحیح بغل کردن شیرخوار برای شیردهی



مادر هنگام شیردهی (چه به حالت نشسته و یا خوابیده) باید در وضعیت کاملا راحتی قرار گیرد تا بتواند به آسانی شیرخوار را در آغوش گرفته و به پستان بچسباند. در حالت نشسته روی مبل یا صندلی راحت، داشتن تکیه گاه زیر پا و استفاده از بالش برای حمایت شیرخوار و هم سطح کردن سر شیرخوار با پستان، و در حالت خوابیده گذاشتن بالش سفتی در پشت و بالشی زیر سر معمولا وضعیت راحتی را برای مادر فراهم می کند.

چهار نکته کلیدی وضعیت صحیح در آغوش گرفتن شیرخوار برای شیردهی باید رعایت شود:


- سر، گردن، گوش ها، تنه و باسن شیرخوار در یک امتداد قرار گیرد.
- بدن شیرخوار روبروی مادر و در تماس نزدیک با بدن او باشد.
- صورت شیرخوار روبروی پستان مادر بطوری که بینی او هم سطح نوک پستان قرار گیرد.
- بدن شیرخوار با دست مادر حمایت شود. (در ماه اول علاوه بر حمایت شانه ها و سر نوزاد باید باسن او نیز در آغوش مادر باشد.)

شناخت وضعیت های مختلف شیردهی


از آنجا که مادران معمولا بغل کردن شیرخوار به روش گهواره ای را می شناسند، بهتر است با روش های مختلف آشنا شوند تا پس از زایمان بتوانند بطور عملی تمرین کرده و بهترین وضعیت هایی که برای مادر و شیرخوار راحت تر است انتخاب کنند.

وضعیت گهواره ای متقابل: روشی ایده آل برای اوایل شیردهی، کنترل سر شیرخوار و آوردن او به طرف پستان و همچنین برای شیرخوارانی است که در پستان گرفتن مشکل دارند. استفاده از این روش در نوزادان نارس و کوچک که


عضلات شل دارند و مادرانی که نوک پستان شان آزاده شده بهترین روش شیردادن می باشد. اگر مادر از پستان چپ می خواهد کودک را شیر بدهد، شیرخوار را با دست راست نگهدارد و بالعکس. دست مادر قاعده گردن و بالای شانه شیرخوار را نگه می دارد و بدن شیرخوار در امتداد طول ساعد مادر قرار می گیرد. از دست طرف پستان مورد استفاده، برای نگهداری پستان استفاده می شود. بدن شیرخوار به پهلو رو به مادر است و دهان او زیر نوک پستان و بینی او هم سطح با نوک پستان مادر است.



وضعیت گهواره ای (معمولی یا سنتی): یکی از مرسوم ترین روش های نگهداشتن کودک برای شیردهی است. سر شیرخوار در خم آرنج مادر قرار می گیرد و بدنش با ساعد مادر حمایت می شود. این روش برای زمانی که شیرخوار رشد می کند و بخوبی سر خود را کنترل می کند مناسب است. در این روش باید مراقب بود که مادر به سمت شیرخوار خم نشود، دست زیرین شیرخوار در پهلوئی مادر قرار گیرد و بین مادر و شیرخوار واقع نشود، استفاده از بالش روی ران های مادر برای هم سطح نمودن شیرخوار با پستان توصیه می شود.



وضعیت زیر بغلی: در این وضعیت، مادر می نشیند و سر نوزاد به طرف پستان و بدنش زیر بغل مادر در پهلوئی وی قرار می گیرد. باسن کودک روی بالشی نزدیک آرنج مادر است تا نوزاد را به سطح پستان برساند. در این وضعیت برای راحتی بیشتر، پشت شانه های مادر هم بالش گذاشته شود تا بعد از پستان گرفتن شیرخوار، تکیه دهد.



در شرایط خاص مثل بزرگ بودن پستان ها یا نوک پستان صاف یا فرورفته، این وضعیت ارجح است چون مادر دید بهتری بر شیرخوار و کنترل بیشتری بر سر او دارد. این وضعیت برای مادرانی که تحت عمل سزارین قرار گرفته اند، و در مواردی که بچه خواب آلود است یا در یادگیری تغذیه با شیر مادر مشکل دارد، همچنین برای کودکان نارس و کودکانی که مکیدن ضعیف دارند، و برای تغذیه همزمان دوقلوها مفید می باشد.

وضعیت خوابیده به پهلو: در این وضعیت مادر و کودک به پهلو روبروی هم می خوابند. می توانید چند بالش زیر سر، پشت و زیر زانویی که به طرف بالا است بگذارید. بچه به پهلو و روبروی مادر طوری قرار می گیرد که پشتش بر بازوی او تکیه دارد و زانوهایش به طرف مادر کشیده شده است. ممکن است لازم باشد که یک بالش کوچک، پتو یا حوله تا شده در پشت شیرخوار هم گذاشته شود. در مادرانی که سزارین شده اند گاهی لازم است برای محافظت بخیه ها، بین مادر و شیرخوار یک بالش کوچک یا یک حوله تا شده کوچکی قرار بگیرد.



وضعیت خوابیده به پشت: گرچه این روش، وضعیت مناسبی برای شیردهی نیست اما ممکن است در ساعات اولیه پس از زایمان یا شرایط دیگری که مادر نیاز به خوابیدن به پشت داشته باشد، استفاده شود. در وضعیت خوابیده به پشت مادر می تواند به یک پهلو غلطیده و از یک پستان شیر بدهد، سپس به پهلوئی دیگر غلطیده و از پستان دوم شیر بدهد. توصیه می شود مادر راه های مختلف را تجربه کرده و آسان ترین وضعیت را برای خود و کودکش پیدا کند، معمولاً گذاشتن یک بالش زیر سر لازم است. بعضی از مادران ترجیح می دهند چندین



بالش یا کوسن را زیر بالاتنه و سر خود بگذارند تا این قسمت از بدن آنها بالاتر باشد. یک بالش زیر ران نیز راحتی بیشتری را فراهم می‌کند.

نحوه عرضه پستان به شیرخوار

مادر پس از قرار گرفتن در وضعیت مناسب باید پستانش را بشرح زیر نگهداشته و به کودک عرضه کند: پستان باید به گونه‌ای در دست مادر قرار گیرد که انگشتانش عقب‌تر و با فاصله از هاله قرار گیرند. در صورتی که به شکل حرف C پستانش را حمایت می‌کند باید انگشت شست در بالا و سایر انگشتانش (برحسب اندازه پستان) با رعایت نکات ذکر شده، زیر پستان و یا چسبیده به قفسه سینه قرار گیرند.

- اگر مادر مایل است پستانش را با دو انگشت اشاره و میانی (به حالت قیچی) بگیرد باید انگشتان او به اندازه کافی عقب هاله قرار گیرند تا مزاحم پستان گرفتن شیرخوار نشوند. این نوع گرفتن برای مادری که انگشتان بلند یا پستان کوچک دارد، مفیدتر است.



درست



نادرست

نحوه صحیح پستان گرفتن شیرخوار

مادر باید لب فوقانی شیرخوار را با نوک پستانش لمس کند تا او دهانش را باز نماید. برای گرفتن قسمت زیادی از پستان و هاله باید دهان او کاملاً باز شود. سپس او را به سرعت و به آرامی به طرف پستان خود بیاورد و نباید خودش یا پستان را به طرف او حرکت دهد. باید به نحوی شیرخوار را جلو بیاورد که لب تحتانی او زیر نوک پستان قرار بگیرد در اینصورت ابتدا چانه کودک، پستان را لمس خواهد کرد.



چهار نکته کلیدی وضعیت پستان گرفتن صحیح

- دهان شیرخوار کاملاً باز است.
- لب تحتانی به سمت بیرون برگشته است.
- چانه کودک در تماس با پستان مادر است.
- اگر هاله دیده می‌شود قسمت بیشتری از هاله در بالای لب فوقانی شیرخوار در مقایسه با لب پائینی دیده می‌شود.



ب: شیرخوار پستان را نادرست در دهان گرفته است الف: شیرخوار پستان را درست در دهان گرفته است

علائم مکیدن موثر پستان

هنگامی که شیرخوار به خوبی به پستان نزدیک است و مقدار زیادی از بافت پستان را به دهان می برد، قادر خواهد بود نوک پستان را به عقب دهان (کام نرم) برساند. با این عمل رفلکس مکیدن تحریک می شود. هنگامی که شیرخوار پستان را خوب گرفته باشد، احتمالاً خوب می مکد و شیر کافی دریافت می کند. علائمی نشان می دهد که مکیدن موثر و صحیح است.

چهار نکته کلیدی مکیدن موثر

- با ورود شیر به دهان شیرخوار، مکیدن ها آرام و عمیق و گاهی با مکث است.
- صدای قورت دادن شیرخوار به خوبی شنیده می شود یا بلع او مشاهده می شود.
- گونه هایش گرد و برآمده است، در طول تغذیه فرورفته نیست و تو کشیده نمی شود.
- شیرخوار پس از شیر خوردن، خود پستان را رها می کند و راضی به نظر می رسد.
- ضمنا مادر متوجه علائم بازتاب جهش شیر می شود.



فصل پنجم - دوشیدن شیر مادر، نحوه نگهداری و مصرف شیر دوشیده شده

اهداف آموزشی:

- شناخت نکات مهم در دوشیدن شیر مادر
- آشنایی با روش های دوشیدن شیر
- آگاهی از مدت و دفعات و نحوه نگهداری شیر دوشیده شده
- آگاهی از نحوه تغذیه شیرخوار با شیردوشیده

نکات مهم در دوشیدن شیر مادر

مواقع دوشیدن شیر

- در شرایط مختلف از قبیل جدایی مادر و شیرخوار مثل مادر شاغل، نوزاد بستری که نتواند مستقیم از پستان شیر بخورد و یا احتقان پستان و به منظور افزایش تولید شیر، مادر باید شیرش را بدوشد. پس باید تمام مادران اعم از شاغل یا خانه دار روش صحیح دوشیدن شیر را بدانند.
- معمولاً دوشیدن شیر پس از هر وعده تغذیه کودک راحت تر است زیرا شیر به جریان افتاده است و با تخلیه پستان به تولید شیر کمک می شود. گفته می شود با دوشیدن شیر در بعد از ظهر شیر کمتری نسبت به صبح بدست می آید که این امر طبیعی است. از طرفی ماساژ پستان در حین دوشیدن شیر سبب افزایش حجم شیر دوشیده شده می شود.
- برخی مادران چندین هفته قبل از شروع بکار، شیر خود را دوشیده و ذخیره می کنند. مادران خانه دار نیز اگر بدلیلی قرار باشد چند ساعت در خانه نباشند، می توانند ۱ یا ۲ بار شیرشان را دوشیده و برای تغذیه شیرخوار نگهداری کنند.
- شیردهی مکرر در تعطیلات و شب ها که مادر و شیرخوار با هم هستند، تولید شیر را بیشتر می کند.

آمادگی مادر و نکاتی که قبل از دوشیدن شیر باید به آن توجه نمود:

- مادر باید محل راحت و مناسبی را برای دوشیدن شیر انتخاب نماید.
- دوشیدن شیر باید در آرامش انجام شود بنابراین باید وقت کافی برای آن منظور گردد.
- مادر باید قبل از دوشیدن شیر دستهایش را با آب و صابون بشوید.
- مادر قبل از دوشیدن از روش های جریان انداختن شیر کمک بگیرد. وقتی مادر شیرش را می دوشد مانند موقعی که شیرخوار پستان را می مکد، بازتاب جاری شدن شیر تحریک نمی شود بنابراین مادر موقع دوشیدن باید خود به تحریک و جریان انداختن شیرش کمک کند. از جمله: استراحت قبل از دوشیدن، دوش گرفتن، صرف

نوشیدنی گرم (بجز قهوه)، فکر کردن به کودک، شنیدن صدای او و یا نگاه کردن به تصویر او، عدم اضطراب، در صورت امکان برقراری تماس پوستی با شیرخوار، ماساژ پشت مادر و ماساژ پستان، گذاشتن حوله گرم روی پستان بمدت ۵ تا ۱۰ دقیقه کمک کننده است.

- اگر مادر شاغل است هنگام صبح باید زودتر بیدار شود و شیرخوار را تغذیه نماید و سپس بقیه شیرش را بدوشد تا در طول روز به شیرخوار داده شود.
- شیرخوار هنگام دوری مادر، حدود نصف فنجان یا ۱۰۰ سی سی شیر دوشیده شده برای وعده بعدی نیاز دارد.

آماده کردن ظرف برای جمع آوری شیر

- مادر لیوان، فنجان، یا شیشه دهان گشادی از جنس شیشه یا پلاستیک که بتواند درب آن را بپوشاند انتخاب نماید و آن را با آب و صابون بشوید.
- اگر شیر برای شیرخوار بیمار یا نارس جمع آوری می شود، ظرف باید استریل باشد.

روش های دوشیدن شیر

روش های متفاوتی برای دوشیدن شیر وجود دارد: دوشیدن شیر با دست، دوشیدن با پمپ دستی یا برقی (شیردوش)، روش ترکیبی دست و پمپ.

دوشیدن شیر با دست، ساده و در هر محل قابل اجرا می باشد و مادر به مرور مهارت لازم را کسب می نماید. باید تمام مادران آموزش دوشیدن شیر با دست را ببینند.

انتخاب نوع مناسب پمپ (بر حسب نیاز مادر و شیرخوار) و نحوه دوشیدن شیر با پمپ را بعد از زایمان در بیمارستان به مادر آموزش خواهند داد. اما مادر باردار بداند جزو وسایلی که معمولاً در بارداری تدارک می بیند، از پمپ هایی که ته آن بادکنک لاستیکی دارد و شبیه بوق دوچرخه هستند خریداری نکند که مناسب نیستند. با شیردوش هایی که دوتایی هستند و همزمان هر دو پستان را می دوشند، شیر بیشتری بدست می آید. روش ترکیبی دست و پمپ برای مادران دارای نوزاد نارس روش بسیار مفیدی است.

دوشیدن شیر با دست

مادر باید دست هایش را بشوید. پس از اقدامات کمکی برای جریان انداختن شیر (که در بالا گفته شد)، دوشیدن شیر را می توان به دو روش انجام داد:

روش اول


۱. موقعیت قرار گرفتن دست: شست در بالا و دوانگشت اول و یا سایر انگشتان زیر پستان روی لبه هاله به شکل حرف C طوری قرار گیرد که حدود ۳ سانتی متر (به اندازه یک بند انگشت شست) از قاعده نوک پستان فاصله داشته باشد به طوری که ذخایر شیر درست زیر انگشتان واقع شوند. شست و سایر انگشتان باید در دو طرف پستان و در مقابل هم قرار گیرند.

۲. پستان باید به طور مستقیم کمی به طرف قفسه سینه فشار داده شود. پستان های بزرگ را می توان قدری بالا آورده و سپس فشار داد.

۳. سپس پستان را به کمک شست و انگشتان به طرف جلو آورد و بعد به قسمت لبه هاله فشار وارد نمود تا شیر به آسانی خارج شود.


۴. مراحل ۱-۳ مرتب تکرار شود.

۵. بعد از چند دقیقه دوشیدن، محل شست و انگشتان را باید دور هاله در تمام قسمت‌ها تغییر داد یعنی به صورت افقی، مایل راست، مایل چپ (مانند تصاویر) هم با دست راست و هم با دست چپ پستان دوشیده شود.




دست راست

دست چپ



مرحله ۱



مرحله ۲ تا ۳

روش دوم

۱. انگشت شست در بالای پستان و انگشت پنجم چسبیده به قفسه سینه مادر و سایر انگشتان در زیر پستان بنحوی که روی هاله و نوک پستان نباشد.
 ۲. حرکت موجی شکل انگشتان به روی پستان به نحوی است که ابتدا انگشت پنجم سپس انگشت چهارم سپس انگشت سوم و نهایتاً انگشت اشاره از زیر و همراه با انگشت شست از بالا پستان را می فشارند.
- دوشیدن شیر نباید به پستان صدمه بزند. لذا باید از فشار دادن سایر نقاط پستان، کشیدن پستان و نوک آن، لغزاندن دست روی پستان که موجب کوفتگی و آسیب بافت پستان می شود، پرهیز نمود.

مدت و دفعات دوشیدن و نحوه نگهداری شیر دوشیده شده

طول مدت دوشیدن شیر

- دوشیدن شیر معمولاً ۲۰-۳۰ دقیقه وقت می گیرد. در حین دوشیدن پس از احساس خستگی دست، محل دوشیدن را با جابجائی دست تغییر دهید. دوشیدن تا زمان کند شدن جریان شیر ادامه می یابد.
- در ابتدای دوشیدن پستان، ممکن است شیری خارج نشود اما پس از چند دقیقه شیر شروع به چکیدن می کند و اگر بازتاب جاری شدن شیر (رفلکس اکسی توسین) فعال باشد، شیر بیشتری جاری می شود.
- زمان دوشیدن آغوز برای نوزادی که قادر به مکیدن نباشد باید اندکی بعد از زایمان و ترجیحاً طی مدت ۶ ساعت اول تولد انجام شود.

- دوشیدن آغوز با دست به نحوی است که با ۲۰-۱۰ حرکت، دوشیدن تا زمان کند شدن جریان شیر از یک پستان ادامه دارد و سپس ادامه دوشیدن از پستان دیگر نیز به همین روش انجام می شود.

دفعات دوشیدن شیر

تعداد دفعات دوشیدن شیر، بستگی به دلایل دوشیدن در شرایط مختلف دارد. از جمله:
تغذیه با آغوز: برای نوزادی که قادر به مکیدن نیست، مادر می‌تواند آغوز مورد نیاز او را که معمولاً به اندازه ۱ تا ۲ قاشق مرباخوری است از پستان دوشیده و وی را تغذیه نماید. باتوجه به گنجایش خیلی کم معده نوزاد، هر ۱ تا ۲ ساعت عمل دوشیدن شیر و تغذیه نوزاد ادامه یابد.

تغذیه نوزادان کم وزن در هنگام تولد و شیرخواران بیمار: برای شیرخواران برحسب نیاز آنان به تغذیه که معمولاً هر ۳ ساعت یکبار یا ۸ بار در ۲۴ ساعت است شیر باید دوشیده شود. نوزادان نارس و کم وزن در ابتدا نیاز به شیر کمتری دارند باید ضمن تشویق مادر به دادن آغوز از همان مقدار کم، و با استفاده از روش‌هایی از قبیل جمع آوری مستقیم شیر با سرنگ از نوک پستان، دوشیدن در قاشق و یا فنجان کوچک، یا دوشیدن مستقیم در دهان، تغذیه شیرخوار انجام شود و هر ۲-۳ ساعت یکبار آغوز را بدوشند.



نحوه جمع آوری آغوز

تداوم تولید شیر در هنگام بیماری مادر یا شیرخوار: به تعداد دفعاتی که شیرخوار به طور طبیعی (حداقل هر ۳ ساعت یکبار) تغذیه می‌شود، دوشیدن لازم است.

دوشیدن شیر به منظور افزایش تولید شیر: در این حالت دوشیدن شیر به مدت ۲۰ دقیقه هر ۲-۳ ساعت یک بار حداقل ۶ بار در روز و با حداقل یک نوبت در شب توصیه می‌شود به طوری که کل مدت دوشیدن شیر در شبانه روز کمتر از ۱۰۰ دقیقه نباشد.

برای برقراری شیردهی مجدد: دوشیدن شیر ۸ تا ۱۲ بار در شبانه روز و هر بار به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه توصیه می‌شود.
تسکین احتقان پستان: هر چند بار و هر مقدار شیر که برای تسکین پستان‌ها و کاهش تورم هاله و کشش نوک پستان لازم است، باید شیر دوشیده شود تا شیرخوار بتواند به راحتی پستان را بمکد. بعضی از مادران ممکن است موقتاً قبل از هر بار تغذیه شیرخوار نیاز به دوشیدن شیر داشته باشند و برای برخی دیگر دوشیدن ۱ یا ۲ بار در روز کافی باشد. وقتی پستان‌ها محتقن و دردناک هستند دوشیدن با دست مشکل است ولی استفاده از بطری گرم دوشیدن را راحت‌تر می‌کند که کارکنان بهداشتی درمانی شیوه انجام آن را به موقع ضروری به مادر نشان می‌دهند.

رفع نشت شیر از پستان: دوشیدن مقدار زیاد شیر لازم نیست فقط به مقداری که فشار داخل پستان‌ها کاهش یابد، کافی است.

تغذیه شیرخوار هنگام اشتغال به کار مادر در خارج از منزل: مادر می‌تواند قبل از خروج از منزل، بخشی از شیر مورد نیاز شیرخوار را بدوشد که بستگی به ساعات دوری، وزن و سن شیرخوار دارد. بعضی از مادران شیر مورد نیاز شیرخوار را در مدت ۱۵ دقیقه و بعضی همان مقدار شیر را در مدت ۳۰ دقیقه از پستان تخلیه می‌نمایند. ضمناً مادر می‌تواند از شیرهای دوشیده شده قبلی نیز استفاده نماید و به مراقب کودک نشان دهد که چگونه شیر دوشیده شده را با فنجان به شیرخوار بدهد.

مدت ذخیره کردن شیر دوشیده شده

برای شیرخوار سالم

- شیر دوشیده شده در حرارت اتاق (۲۵-۱۵ درجه که در معرض منبع حرارتی و نور نباشد) تا ۸ ساعت قابل نگهداری است.
- در یخچال (دمای ۴ درجه) تا ۴۸ ساعت، و اگر دمای یخچال ثابت است و نوسان ندارد تا ۵-۳ روز قابل استفاده است.
- در جا یخی یخچال تا ۲ هفته و در فریزر خانگی تا ۳ ماه قابل نگهداری می باشد.
- شیر منجمد ذوب شده در یخچال کمتر از ۲۴ ساعت.

برای نوزادان نارس و یا بستری

نگهداری شیر تازه در دمای اتاق تا ۲۵ درجه سانتیگراد ۴ ساعت، در یخچال ۴۸ ساعت و شیر ذوب شده در یخچال حداکثر به مدت ۱۲ ساعت و مصرف فوری شیر منجمدی که ذوب شده در دمای اتاق طی ۱ ساعت توصیه می شود.

نحوه ذخیره کردن و نگهداری شیر دوشیده شده

- ظرف نگهداری شیر باید دارای درب و در درجه اول از جنس شیشه باشد و در درجه دوم از جنس پلاستیک سخت شفاف توصیه می شود.
- برای نگهداری شیر در فریزر، باید سه چهارم حجم ظرف از شیر پر شود و در آن را بسته و پس از نوشتن تاریخ دوشیدن شیر، در فریزر بگذارند. باید شیرهای قدیمی را زودتر استفاده نمایند. بهتر است ۳۰ تا ۶۰ میلی لیتر در هر ظرف برای هر وعده و حداکثر ۱۲۰ میلی لیتر نگهداری شود.
- در صورت تمایل، شیر دوشیده شده تازه را پس از گذاشتن حداقل ۱ ساعت در یخچال به شیر قبلی که همان روز دوشیده شده و در یخچال نگهداری شده را می توان افزود. شیر دوشیده شده گرم را به شیر فریز شده قبلی اضافه نکنید.
- در طی نگهداری شیر مادر، چربی شیر به صورت یک لایه سفید رنگ ضخیم در قسمت بالای شیر نمایان خواهد شد که می توان آن را به آرامی توسط چرخاندن ظرف محتوی شیر مخلوط نمود ولی از تکاندن دادن شدید آن پرهیز نمایید.
- رنگ شیر روزانه ممکن است متفاوت باشد و بر حسب رژیم مادر به رنگ آبی، زرد و یا قهوه ای باشد و همچنین شیر فریز شده ممکن است بوی متفاوتی (مثل بوی صابون) داشته باشد و اگر شیرخوار تمایل به خوردن آن دارد، اشکالی ایجاد نمی کند.
- برای استفاده از شیر دوشیده منجمد شده، باید ظرف را زیر آب ولرم تکان داده تا کم یخ آن باز شود و طی یک ساعت همچنان که گرم است مصرف کرد، یا شب قبل آن را در یخچال قرار داد تا به آرامی ذوب شود و طی ۲۴ ساعت (که در یخچال نگهداری می شود) استفاده کرد.
- شیر ذوب شده را نباید مجدداً منجمد نمود.
- شیر دوشیده شده را نباید جوشانید یا با ماکروفر گرم کرد تا عوامل حفاظتی شیر از بین نرود.

نحوه تغذیه شیرخوار با شیر دوشیده شده

شیردوشیده شده را می توان با قاشق، سرنگ، قطره چکان، فنجان یا وسیله کمکی که لوله آن به پستان چسبانده می شود، به شیرخوار داد. از قاشق، سرنگ، قطره چکان معمولاً برای مقدار کم در روزهای اول استفاده می شود و هر گاه حجم شیر دوشیده شده حداقل ۱۰ میلی لیتر باشد، استفاده از فنجان توصیه می شود. به هیچ وجه از بطری نباید استفاده کرد. تغذیه با فنجان مثل بطری سبب سردرگمی شیرخوار در مکیدن پستان نمی شود و شیرخوار می تواند به خوبی پستان را گرفته و بمکد. در تغذیه با فنجان احتمال ابتلا به اسهال، عفونت ها و تأخیر رشد دندانی کمتر است. تمیز کردن فنجان با آب و صابون راحت تر است. هنگام تغذیه با فنجان شیرخوار در بغل گرفته می شود و قدری از نیازهای عاطفی او ارضا می شود. بعلاوه شیرخوار شیر دریافتی خود را کنترل می کند.

روش تغذیه با فنجان

- دست هایتان را بشوید.
- شیرخوار باید بیدار و هشیار باشد. دست های شیرخوار را در ملافه ای مثل قنداق بپیچید تا به فنجان دست نزنند.
- شیرخوار باید به حالت نشسته با حمایت پشت وی در بغل نشاندۀ شود.
- لبه فنجان کوچک شیر را روی لب شیرخوار نگهدارید. فنجان را کج نموده تا شیر بال لب شیرخوار تماس پیدا کند.
- نوزاد نارس شیر را با زبانش به داخل دهان خود می کشد و نوزاد رسیده یا شیرخوار بزرگتر شیر را می مکد و یا جرعه جرعه می نوشد و در این حالت مقداری شیر از اطراف دهانش می ریزد.
- از ریختن شیر در درون دهان شیرخوار خودداری شود.

